



ENJAYMO™ (SUTIMLIMAB)

GUIDE POUR LES PATIENTS

▼ Enjaymo™ (Sutimlimab)

Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire. Cela permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.



Behördlich angeordnetes Informationsmaterial
Matériel d'information exigé par l'autorité compétente
Materiale informativo richiesto dall'autorità competente

Ce matériel d'information a été exigé par Swissmedic au titre de mesure de réduction des risques. Il doit garantir que les patientes et patients connaissent et prennent en compte les exigences particulières en matière de sécurité relatives à Enjaymo®. La responsabilité juridique du matériel d'information incombe à Recordati AG.



Ce guide contient des informations sur les points suivants :

- Qu'est-ce que Enjaymo (sutimlimab)
- Risque d'infections graves et d'infections à méningocoques
- Recommandations de vaccination
- Symptômes d'infections à surveiller pendant le traitement par Enjaymo

Ce que vous devez savoir sur Enjaymo



Enjaymo est un médicament sur ordonnance utilisé pour traiter la dégradation des globules rouges (hémolyse) chez les patients adultes atteints de la maladie des agglutinines froides. Il atténue l'anémie et réduit les signes de fatigue.



La maladie des agglutinines froides est une maladie rare du sang dans laquelle certains anticorps du système immunitaire (défense de l'organisme) se lient aux globules rouges. Cela entraîne une destruction des globules rouges (hémolyse).

Risque d'infections lors d'un traitement par Enjaymo

Enjaymo contribue à prévenir la destruction des globules rouges en bloquant une partie du système de défense immunitaire humain, appelée voie classique du complément. Cette voie est normalement impliquée dans la lutte contre les infections. C'est pourquoi les infections graves (telles que pneumonie, septicémie) et les infections à méningocoques font partie des risques liés au traitement par Enjaymo.



Vaccinations¹

Avant de commencer un traitement avec Enjaymo, votre médecin discutera avec vous de l'importance des vaccinations.

- Assurez-vous auprès de votre médecin que vous avez reçu tous les vaccins nécessaires selon les recommandations actuelles de la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV), y compris les vaccins contre les méningocoques et les pneumocoques.
- Il est recommandé de recevoir un vaccin contre les méningocoques et les pneumocoques au moins 2 semaines avant votre première dose d'Enjaymo, si vous n'avez jamais été vacciné auparavant.
- Même si vous avez été vacciné dans le passé, vous devez recevoir des rappels de vaccination. Votre médecin vous indiquera si vous avez besoin d'une vaccination supplémentaire contre les méningocoques et les pneumocoques.
- Si votre médecin décide que le traitement par Enjaymo est urgent, vous devez être vacciné dès que possible après le début du traitement.
- La vaccination contre certaines infections bactériennes peut réduire votre risque de contracter ces infections, mais ne peut pas les éliminer complètement.



Symptômes et signes d'infection à surveiller

Informez votre médecin si vous avez une infection, y compris une infection existante comme le VIH, l'hépatite B ou l'hépatite C. Informez votre médecin dès que possible si vous pensez avoir une infection pendant le traitement par Enjaymo ou si l'un des symptômes suivants, qui peuvent être des signes d'infection, apparaît :

- Fièvre avec ou sans éruption cutanée
- Frissons
- Troubles pseudo-grippaux
- Toux/difficultés respiratoires
- Maux de tête accompagnés de nausées, de vomissements, d'une raideur du cou ou du dos
- Confusion mentale
- Sensibilité des yeux à la lumière
- Douleurs lors de la miction ou mictions plus fréquentes

Références :

- 1 Commission fédérale pour les vaccinations (CFV), <https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/organisation/ausserparlamentarische-kommissionen/eidgenoessische-kommission-fuer-impffragen-ekif.html>